

बिषय-सूची

अम्बा खेती

<u>क्र.सं.</u>	<u>बिषय</u>	<u>पेज</u>
१.	परिचय, महत्व र उपयोग	१
२.	माटो र हावापानी	२
३.	जातहरू	३
४.	प्रजनन् बिधि	५
५.	लगाउने बिधि	६
६.	बगैचा व्यवस्थापन	७
७.	सिंचाइ	८
८.	अन्तरवाली र काँटछाँट	९
९.	फूल तथा फलको विकास	१०
१०.	रोगकीरा व्यवस्थापन	११
११.	भण्डारण/संचिती	१४

अम्बा खेती

अर्जुन कुमार श्रेष्ठ*

परिचयः

फलहरू मध्ये एक वेगै एवं महत्वपूर्ण स्थान ओगटन सफल अम्बाको उत्पत्ति मध्य अमेरिकामा भएको मानिन्छ । अम्बालाई गरीबको स्याऊ (Poor man's apple) भनेर पनि चिनिन्छ । अम्बालाई साधारण बोलीचालीको भाषामा वेलौती पनि भनिन्छ । अम्बा नेपालको पहाड, भित्री मध्येश एवं तराइका विभिन्न भागमा लगाइएको पाइन्छ । सन् २००० मा कृषि मन्त्रालयबाट प्रकाशित एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अम्बा खेतीले करिब ४३२८ हेक्टर क्षेत्रफल ढाकेको अनुमान छ । यसको खेती संख्यासभा, काख्रे, धादिङ, बारा चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, कञ्चनपुर, लगायत २२ वटा जिल्लाहरूमा लगभग ५० हेक्टर जग्गामा अम्बाको व्यवसायीक उत्पादन भईरहेको छ ।

महत्व र उपयोगः

पाकेको अम्बालाई ताजै खाने गरिन्छ । पाकेको अम्बामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन 'सी' पाइन्छ, जुन सुन्तलाको रसमा रहेको भिटामिन 'सी' को तुलनामा ५ गुणा बढी हुन्छ । त्यस्तै अम्बा क्यालियम, फस्फोरस, राइबोफ्लाविन, पान्टोथोनिक एसिड, थायमिन र नियासिन (भिटामिन वी कम्प्लेक्स) को पनि श्रोत हो । साधारणतया रातो गुदी भएका अम्बाको तुलनामा सेतो गुदी भएका अम्बामा भिटामिन सी बढी पाइन्छ ।

त्यसैगरी पाकेको अम्बाको फलमा ८-१०% घुलनशील ठोस पदार्थ र ८०-८५% पानी पाइन्छ । अम्बाको फलमा प्रशस्त मात्रामा पेकिटन पाइने हुँदा यसवाट उच्च गुणस्तरको जेली बनाउन सकिन्छ । अम्बाको वीउमा प्रशस्त मात्रामा फलाम तत्व पाइने भएता पनि वीउ शरीरमा

* उप-प्राध्यापक, वागवानी विभाग, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर, ।

सजिलैसंग नपच्ने हुँदा यो तत्व त्यसै खेर जान्छ । यसको फलवाट आइसक्रिम, सर्वत, Sugar Syrup र Fruit butter बनाउन सकिन्छ । अम्बाको कलिला पात र बोक्रालाई आउँ र पखालाको उपचार गर्न गाउँघरमा पिघेर खुवाउँने गरिन्छ । त्यसैगरी कलिला पात र बोक्रावाट कपडा रंगाउने रङ्ग बनाउन पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

हावापानी:

अम्बालाई उण्ण र उपोष्ण हावापानी भएका ठाँउहरूमा सजिलैसंग लगाउन सकिन्छ । खासगरी समुद्र सतहदेखि १५०० मिटरको उचाइ भएका नेपालका पहाडी भू-भागहरूमा समेत यसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । उच्च गुणस्तरको प्रशस्त उत्पादन लिनको लागि जाडो महिना अर्थात विशेष हिँउद ऋतुको आबश्यकता पर्दछ । फुल्ने र फलने समयमा अम्बालाई सुख्खा वातावरणको जरूरत पर्दछ । अन्यथा यदि उक्त समयमा सापेक्षिक आर्द्रता बढी भएमा वोटको वृद्धि त प्रशस्त हुन्छ तर न्यून गुणस्तरको फल वोटले दिन्छ । फलको विकास हुने समयमा वायुमण्डलको तापक्रम यदि बढी हुन गएमा अम्बाका फलहरू भर्ने समस्या देखा पर्दछ । अम्बाको बृद्धि विकास एवं उत्पादन सफलतापूर्वक लिनको लागि वायुमण्डलीय तापक्रम २३ डिग्री सेल्सियस र १०००-२००० मिलिमिटर वर्षा हुने ठाउँमा यसको खेती गर्नु राम्रो हुन्छ । तर फूल फुल्ने तथा फलको वृद्धि विकास एवं पाकने समयमा वर्षा नभएमा राम्रो मानिन्छ ।

माटो:

अम्बालाई सबै प्रकारका माटोमा लगाउन सकिन्छ । नेपालमा पाइने रातो, कालो, चिम्ट्याईलो तथा वलौटे माटोमा यसको खेती गरिन्छ । तर अम्बाको विरुवाले पानी जमेको खप्न नसक्ने हुँदा पानी जम्ने र भूमिगत पानीको सतह नजिक भएमा यसको खेती राम्रो हुँदैन । वास्तवमा सफल अम्बा खेतीको लागि गहिरो, मलिलो, बुर्बुराउँदो र निकासको उचित व्यवस्था भएको जग्गा छन्नु उचित हुन्छ । अम्बाको सतही जरा हुने विरुवा भएकोले माटोको माथिल्लो सतह (०-२० सेमि) मलिलो हुनु जरूरी छ (हेज तथा तिवारी, १९८१) अम्बालाई अम्लिय र क्षारिय दुवै प्रकारका माटोमा सफलताका साथ लगाउन सकिएता पनि

माटोको पिएच ४.५-८.२ भएको ठाउँमा यसको खेती राम्रोसंग गर्न सकिन्छ ।

जातहरू:

अम्बा Myrtaceae परिवार अन्तरगत सिडियम (*Psidium*) समूहमा पर्दछ । यस समूहमा करिब १५० वटा जातहरू पर्दछन् । त्यस मध्ये नेपालमा खेती गरिएका जातहरू भेटनातिर तिखारिएको र टुप्पातिर चौडा भएको नास्पाती जस्ता *pyriferum* जातीहरू हुन, जुन पहाडतिर बढी देखन सकिन्छ भने तराइतिर र भित्री मधेशमा भने गोला जातहरू *guajava* अन्तरगतका जातहरू लगाइएको पाइन्छ । अम्बाका मुख्य जातहरू यस प्रकार छन् ।

अलाहावाद सफेदा (Allahabad Safeda): भारतको उत्तर प्रदेशवाट विकसित भएको यो जातको अम्बाको बोट करिब ६ मिटर अग्लो, घना र लामा हाँगाहरू भएको हुन्छ । पातहरू पनि चौडा हुने यो जातले बढी सुख्खा हावापानी पनि सहन सक्दछ । यसका फलहरू गोला, वाहिरी भाग (बोक्रा) सेतो, पहेलो र गुदी सेतो भएको करिब १५०-२०० ग्रामसम्म तौल भएका हुन्छन् । फलहरूमा गुलियोपना र अमिलियोपना दुवै बढी हुन्छ र राम्रो भण्डारण क्षमता भएको पाइएको छ ।

लखनऊ-४९/सरदार: बोट मझौला आकारको (२-३ मी. अग्लो र पातहरू ठूला (१२-१३ सेमी लामो) र चौडा (६.५ सेमी) हुने यो जात अलाहावाद सफेदावाट छानेर भारतको पुना भन्ने ठाउँमा विकास गरिएको हो । सरदार अम्बा पनि भनेर चिनिने यस जातका फलहरू लाम्चो र फलको बोक्रा पहेलो रंगको हुन्छ । फल गुलियो, गुदि सेतो, नरमखालका वीउहरू र भण्डारण क्षमता बढी हुनु यस जातका अन्य विशेषताहरू हुन ।

चित्तिदार: यो जात अलाहावाद सफेदासंग मिल्दो जुल्दो जात हो तर यसका पातहरू चौडा, टुप्पो तिखारिएका र फेंदतिर चौडा हुन्छन् । फलहरू वाटुला, साना आकारका र बोक्रामा राता थोप्लाहरू भएका हुन्छन् जुन अलाहावाद सफेदामा हुँदैन । यसको गुदि सेतो हुन्छ र फलको सरदर तौल ११० ग्राम हुन्छ । यसको भण्डारण क्षमता पनि राम्रै पाइएको छ ।

चाईनिज अम्बा: यो जातको विरुवाहरु अन्य जातको तुलनामा होचा र पातहरु पनि धेरै साना (६.५-८.० सेमी लम्बाई र ३.०-४.० सेमी चौडाई) हुन्छन्। अन्य जातको तुलनामा यसमा फल र वीउ पनि धेरै साना (गुच्च आकार) र मसिना हुन्छन्। यस जातलाई अम्बामा लाग्ने प्रमुख रोग ओईलाउने रोग (Wilting) को रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको जात पनि भनिन्छ। तसर्थ, यसलाई रुटस्टकको रूपमा प्रयोग गरी विरुवा उत्पादन गरेर रोग निरोधक जातहरु विकसित गर्न प्रयोग गरिएको पाईन्छ।

बनारसी: अन्य जातहरुको तुलनामा फलमा गुलियोपना बढी हुने यो जातको वोट मध्यम आकारको (५.५ मी अग्लो) र पातहरु लामा (१०-१०.५ सेमी र चौडा ५.५ सेमी) र टुप्पो तिखारिएका हुन्छन्। फलहरु गोलाकार र भण्डारण क्षमता मध्यमस्तरको पाइएको छ।

रेड फ्लेष्ड: नाम अनुसार फलको गुदी रातो हुने यस जातको वोट करिब ३.५-४.५ मी अग्ला र पातहरु १० सेमी लामा र औसत ५ सेमी चौडा अनि टुप्पातिर तिखारिएका लाम्चिला हुन्छन्। फलको वोक्रामा कहिलेकाँही राता थोप्ला देखिने ती जातहरु देखदा आकर्षक भएपनि खाँदा खल्लो र भण्डारण क्षमता कम भएका हुन्छन्।

स्थानीय जातहरु : फलहरु नास्पाती आकारका, पाकदा पहेला र चिल्लो रङ्गका देखिने र भण्डारण क्षमता बढी भएतापनि उन्नत जातका तुलनामा उत्पादन कम हुने भएकोले यसको खेती व्यवसायीक रूपमा गरिदैन। ठाउँको नाम अनुसार स्थानीय जातहरुको नाम राखेको पाइन्छ। अन्य जातहरुमा हब्सी, सिडलेस, मिर्जापुरी, नासिक, नागपुर, वेदाना आदि पर्दछन्। वर्णशंकर जातहरुमा सफेदाजाम, कोहिर सफेदा, अर्का अमूल्या र अर्का मृदुला जस्ता जातहरु भारतमा विकसित गरिएका छन्।

नेपालमा खेती गरिएका अम्बाका मुख्य जाहरुमा इलाहावाद सफदा, इलाहावाद रेड, सिडलेस, लखनऊ-४९, एप्पल कलर्ड, रेड कलर्ड र स्थानीय आदि हुन्।

प्रजनन्/प्रसारण विधि:

अम्बालाई वीउ र वनस्पतिक गरी दुवै तरिकावाट प्रसारण गर्न सकिन्छ । वीउवाट वेर्ना उमार्नको लागि पाकेको फलवाट निकालिएको ताजा वीउलाई प्लाष्टिकको थैलो या नर्सरीमा रोपिन्छ । वीउ निकालेको केही दिनपछि नै अम्बाको वीउ उम्भन सक्ने शक्ति नष्ट भएर जाने भनिएता पनि कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अम्बा परियोजनाले गरेको एक अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार अम्बाको वीउ निकालिएको एक वर्ष पछिसम्म पनि उम्भन सक्ने शक्ति नष्ट नभई उत्तर वीउवाट ८० देखि १००% सम्म बेर्ना उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । वीउवाट निकालिएको वेर्ना नै वीउवाट गरिने प्रसारणको प्रमुख श्रोत हो । ती वेर्नाहरू रोपेको ४५-६० दिनपछि वगैचामा रोप्न सकिने भएता पनि प्राय गरेर एक वर्ष पुरानो अम्बाको विरुवालाई वगैचामा रोप्न उपयुक्त हुन्छ । बीउबाट उत्पादन गरिएका वोटको फल मातृ गुणले परिपूर्ण नहुने भएकाले व्यवसायीक रूपमा खेती गर्न उपयुक्त मानिन्दैन ।

वनस्पतिक प्रजननहरू मध्ये कलमी/लेयरिङ (Air and Pot Layering) ग्राफिटङ्ग, वडिङ (Forket, Patch and Shield), स्टुलिङ (Stooling) र कटिङ विधिहरूवाट पनि अम्बाको प्रसारण गर्न सकिन्छ । तर व्यवहारमा किसानहरूले आफ्नो वगैचामा अपनाउने गरेको प्रसारण विधि भने गुटी (Air Layering) हो जुन अम्बामा अति प्रचलित एवं बढी सफलता हासिल गर्न सकिने विधि हो ।

एअर लेयरिङ: एअर लेयरिङ गर्दा रुखको एक वर्ष पुरानो हाँगा जसको व्यास १-१.५ सेमी को छ त्यसमा ३ सेमी लामो गोलाकार (Ring Shaped) कटिङ दिई त्यस बीचको वोक्रालाई निकालेर फालिन्छ । त्यसपछि वोक्रा फालेको ठाउँमा रहेको चिल्लो भागलाई समेत पुछेर त्यस भागलाई पहिले नै पानीमा भिजाइएको Sphagnum Moss वा चिम्ट्याइलो माटोले ढाकेर पोलिथिन फिल्म (प्लाष्टिक) ले छोपिन्छ र प्लाष्टिकको दुवै छेउमा सुतली डोरीले राम्रोसंग बाँधिन्छ । त्यसरी माटोले ढाक्न भन्दा पहिले वोक्रा फालिएको भाग (Girdled Area) मा IBA र NAA जस्ता हर्मोनले उपचार गरेको खण्डमा त्यसवाट चाँडै नै

जरा पलाउन थाल्दछ । गुटी वा Air Layering गर्नको लागि उपयुक्त समय वर्षा ऋतु हो । यसरी लेयरिङ गरेको ३०-४५ दिनपछि वा त्यसमा जरा पलाएपछि त्यस हाँगालाई माउ वोट (Mother Plant) वाट छुट्याएर बढी कम्पोष्ट भएको ठाउँमा रोप्नु पर्दछ र करिब एक वर्षपछि यसलाई वर्गैचामा रोप्न सकिन्छ ।

ग्राफिटङ्ग: ग्राफिटङ्ग गर्नको लागि पनि उन्नत जातको एक वर्ष पुरानो हाँगा या नयाँ विरुवा जसको व्यास १.५ सेमीको छ भने त्यसलाई उही आकारका रोग निरोधक एवं स्थानीय जातका रुटस्टकहरूसंग जोड्ने काम गरिन्छ । प्राय गरेर अम्बामा इनार्चिङ (Approach Grafting), Shoot-Tip Grafting र Veneer grafting गर्ने गरेको पाईएको छ । इनार्चिङ गर्नको लागि छानिएका दुइवटा विरुवालाई जमिन भन्दा १५-२० सेमी माथि साइडवाट वोका ताढ्हेर फालिन्छ र दुईवटा ताढ्हिएका भागलाई एक अर्कासित जोड्डेर वाँड्ने काम गरिन्छ । उपयुक्त मौसममा २ महिना भित्रमा दुई विरुवाहरु एक आपसमा जोडिन्छन् । त्यसपछि रुटस्टकको जोडाई भन्दा माथिल्लो भाग र Scion को जोडाई भन्दा तल्लो भाग काँटी त्यस विरुवालाई नसरीमा लगी करिब १ वर्षसम्म राखिन्छ । त्यसपछि विरुवालाई वर्गैचामा लगेर सार्ने काम गरिन्छ । कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर क्याम्पसमा अम्बा परियोजनाले गरेको एक अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार अम्बाका ५ विभिन्न जातलाई जामुन (*Syzygium cuminii*) संग इनार्चिङ गर्दा ८० % विरुवाहरूमा उक्त कार्य सफल भएको पाइएको छ ।

लगाउने विधि:

अम्बाका विरुवाहरु लगाउने जग्गालाई मनसुन सुरु हुनु भन्दा अगावै अर्थात हिउँदमा नै गहिरो गरी जोतेर सम्याउनु पर्दछ । त्यसपछि उक्त जग्गालाई वर्गाकार, त्रिकोण वा षट्कोण मध्ये कुनै एक विधिवाट रेखाङ्कन गर्न सकिन्छ । साधारणतया अम्बा लगाउनको लागि ०.७५-१ मी साइजको खाडल अर्थात उक्त साइजकै लम्बाई, चौडाई र गहिराई भएको (५-६ मिटरको दूरीमा खन्न पर्दछ । खाडल खन्दा वनस्पतिक प्रसारण गरिएका विरुवाको लागि कम र वीउवाट निकालिएको

विरुद्धालाई बढी दूरी कायम गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी मलिलो ठाउँमा वढी दूरी कायम गर्नु पर्दछ । यसरी हिउँदमा नै तयार पारिएका खाडलहरुमा गाईवस्तुको राम्ररी कुहिएको मल १ भाग र माथिल्लो सतहको माटो २ भाग राम्ररी मिलाएर भर्नु पर्दछ । यसरी तयार पारिएको खाडलमा मनसुनको सुरुवात (जेष्ठ-आषाढ) मा विरुद्धा लगाउनु राम्रो हुन्छ ।

अहिले आएर अम्बालाई कम जग्गामा धेरै विरुद्धा लगाउने पद्धति जसलाई High Density Planting पनि भनिन्छ, बिधिबाट लगाउने चलन छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा ३ मी X ३ मी दूरीमा ३५ वर्षअघि लगाइएको अलाहावाद सफेदाको वोट हालसम्म स्वस्थ रहेको पाइएको छ । यसो भन्दैमा विरुद्धालाई धेरै कम दूरीमा लगाउनु उपयुक्त चाहिए हुँदैन, किनकी कम दूरीमा लगाउँदा वोटहरु धेरै अगला हुन्छन् र राम्रो उत्पादन दिईनन् । विरुद्धा लगाउन सकिए तापनि प्रति विरुद्धा फल उत्पादन र फलको गुणस्तर घट्न सक्दछ । प्राय जसो बढी घनत्वमा विरुद्धा लगाउँदा ३ मी X ३ मी र साधारण अवस्थामा ५ मी X ५ मी को दूरी निर्धारण गर्नु राम्रो हुन्छ । यदि अम्बालाई उपयुक्त दूरीमा लाइनमा लगाउने हो भने उत्तर-दक्षिण गरेर लाइन बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा अम्बाका प्रत्येक बोटहरूले सूर्यको प्रकाश सजिलैसंग पाउन सक्दछन् । जसले गर्दा वोट, फूल र फलको वृद्धि विकास राम्रोसंग हुन जान्छ ।

बगैँचा व्यवस्थापन :

मलखाद: अम्बाको उत्पादनलाई मलखादले निकै प्रभाव पार्दछ । अम्बाको लागि आबश्यक मलको मात्रा विरुद्धाको जात, विरुद्धाको उमेर, व्यवस्थापन तरिका र माटोमा निहित खाद्यतत्व आदिमा भर पर्दछ । साधारणतया करेसावारीमा घर प्रयोजनको लागि लगाइएको अम्बामा मलखादको प्रयोग गरेको पाइदैन तर व्यवस्थित तरिकाले अम्बा खेती गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न मलजलको भूमिका अति नै हुन्छ । त्यस्तै गरी अम्बाको वोटमा नयाँ हाँगाहरुमा मात्रै फल लाग्ने हुँदा उक्त हाँगाहरुको विकासको लागि पनि मलजल अपरिहार्य छ । अम्बालाई तल तालिकामा दिई बमोजिम मलखादको आबश्यक पर्दछ ।

बोटको उमेर (वर्षमा)	गोबरमल केजी/बोट	नाइट्रोजन (ग्राम/बोट)	फस्फोरस (ग्राम/बोट)	पोटास (ग्राम/बोट)
१	१०	६०	३०	३०
२	२०	१२०	६०	६०
३	३०	१२८	९०	९०
४	४०	२४०	१२०	१२०
५	५०	३००	१५०	१५०
६ वा सोभन्दा माथि	६०	३६०	१८०	१८०

मलखाद दिंदा नाइट्रोजनको आधा मात्रा, गोवर/कम्पोष्ट, फस्फोरस र पोटासको पुरै मात्रा चैत्र-वैशाखमा र वाँकी आधा मात्रा नाइट्रोजन आषाढ-श्रावणमा दिनु पर्दछ ।

यदि बोटमा नाइट्रोटनको अभाव देखिएमा ५% यूरिया (५० ग्राम यूरिया प्रतिलिटर पानीको दरले) आबश्यक परिमाणको भोल वनाएर सोझै बिरुवामा छर्किन पनि सकिन्छ । त्यसैगरी आजकल अम्बाको वगैचामा जिङ्ग (जस्ता) र वोरोन (सुहाग) को कमी देखा पर्ने गरेको पाइएको छ । जिङ्गको कमी भएमा पातका नसाहरुको बीचमा हरियोपना हराउनु, पात साना हुनु र उत्पादन घट्नु जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् । यदि त्यस्ता लक्षणहरु देखिएमा २०० ग्राम जिङ्ग अक्साइड १०० लीटर पानीमा मिसाएर १०-१५ दिनको फरकमा २-३ पटक छर्कनु पर्दछ । त्यस्तै सुहाग (वोरोन) को कमी भएको खण्डमा वोरीक एसिडको ०.४% (४ ग्राम वोरीक एसिड प्रतिलिटर पानीमा) को भोल बनाई फूल फुल्नु अघि छर्कनु राम्रो मानिन्छ ।

सिंचाईः अम्बालाई वगैचामा रोपी सकेपछि तुरन्त सिंचाईको आबश्यकता पर्दछ । तसर्थे यदि आकाशवाट पानी परेको छैन भने उक्त अवस्थामा पानी दिनु राम्रो हुन्छ । साधारणतया बुढाभन्दा कम उमेरका विरुवालाई धेरै पटक सिंचाई दिनु आबश्यक पर्दछ । फल नलागेका

कम उमेरका विरुवालाई गर्मी याममा प्रत्येक हप्तामा र जाडो यामभरी केबल २-३ पटक सिंचाई पर्याप्त मानिन्छ । वर्षा ऋतुमा अम्वालाई सिंचाईको आबश्यकता त्यति पर्दैन । साधारणतया फूल र फल लाग्नु भन्दा अगाडीको उमेरको वोटलाई वर्षको ८-१० पटक सिंचाईको आबश्यक पर्दछ । तर उत्पादन दिने रुखलाई भने चैत्र-जेष्ठसम्म दुई हप्ताको फरकमा सिंचाई दिंदा फलको विकास राम्रो हुनाको साथै फल भर्न पनि कम हुन्छ । यदि अम्बाको हिउँदै फल लिने हो भने हिउँदमा पनि आबश्यकता अनुसार सिंचाई गरेमा फलको गुणस्तर राम्रो भएको पाइएको छ ।

अन्तरवाली : वगैचामा अम्बा लगाई सकेपछि वोटमा फल लाग्नु भन्दा अगाडीको समयमा वगैचा भित्र रहेको खाली ठाउँहरुमा छोटा जरा भएका र छोटो आयु भएका तरकारी एवं फलफुलहरु लगाएर वगैचाको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । यसरी लिईने वालीलाई अन्तरवाली भनिन्छ । यसवाट वगैचाको आयश्रोत त बढनुको साथै भारपातको पनि नियन्त्रण हुन जान्छ र किसानले आफ्नो तरकारीको समस्या सजिलै टारी सन्तुलित भोजन खान पनि पाउँछ । यसरी लगाउन सकिने तरकारीहरुमा मुला, भण्टा, गाँजर, रामतोरीया र दालवालीहरुमा चना, मास, सिमी आदि हुन । त्यसै गरेर कफी, मेवा, भुइकटहर इत्यादि छोटो समयमा उत्पादन दिन सक्ने विरुवाहरु अन्तरवालीको रूपमा लगाउन सकिन्छ ।

काँटछाँट: स्वाभावैले अम्बा होचो र भाँगिने खालको बिरुवा हो । मजबुत र आकर्षक वोट बनाई बढी र राम्रो खालको फलहरु उत्पादन गर्ने काँटछाँटको आबश्यकता पर्दछ । अम्बालाई बीचको भाग खुल्ला राखेर गरिने तालिमी जसलाई Open Centre वा Delayed Open Centre भनिन्छ, जसमा सूर्यको प्रकाश बोटको भित्री भागसम्म पुऱ्याउनको लागी दुई हाँगा वीचको कोण ठूलो पारिने विधि अपनाउनु राम्रो हुन्छ । अम्बाको बोटमा फूल र फल नयाँ हाँगाहरुमा लाग्ने हुँदा प्रत्येक वर्ष हलुका काँटछाँट गर्नु राम्रो हुन्छ । काँटछाँट गर्दा पुरानो हाँगाहरुको टुप्पाको २०-३० सेमी लामो भाग काट्नु पर्दछ । साधारणतया काँटछाँट वैशाख महिनामा गरिन्छ । काँटछाँट गर्दा सडेका, रोग लागेका, नमिलेका र फेदैवाट पलाएका हाँगाविझा

समेतलाई छाँटिन्छ । अम्बाको बोटमा साधारणतया जमिन भन्दा ५० सेमी माथिसम्मको भागमा पलाएका हाँगाविझालाई काँटछाँट गरी काण्डहरु सफा राख्नु पर्दछ । यदि ग्राफ्टिङ गरिएका विरुवा लगाइएको छ भने दुई विरुवाहरु जोडिएको ठाउँ अर्थात गाँठो भन्दा तलवाट पलाएका हाँगाविझाहरुलाई पनि काँटछाँट गरी हटाइदिनु पर्दछ । Open Centre तरिकावाट काँटछाँट गर्दा चारवटा हाँगाहरु चारतिर राखेर मुख्य हाँगालाई काटिन्छ । यसरी छनौट गरिएका हाँगाहरु फराकिलो कोण भएका र फरक फरक दूरीमा एक आपसमा नजोडिने खालको हुनु पर्दछ । यसरी हाँगाहरुको तालिम गर्दा पूर्व पश्चिम दिशामा हाँगाहरुलाई बढन दिनु राम्रो मानिन्छ । तीन महिनापछि यी चारवटा हाँगाहरुको टुप्पातिर एक तिहाई भाग हटाई दुईवटा शाखाहरु बढन दिनु पर्दछ । तालिमी गर्न दोश्रो वर्षदेखि सुरु गर्न सकिन्छ । यसरी काँटछाँट गरेको रुखले दिने फलहरु ठूलो र चाँडै पाक्ने गर्दछन् ।

फूल तथा फलको विकास : साधारणतया प्राकृतिक अवस्थामा अम्बा वर्षको दुईपटक फुल्ने गर्दछ । कही कही त वर्षको तीन पटकसम्म फुलेको पाइन्छ तर स्थानीय जातहरु भने वर्षमा एक पटक फुलेको पनि पाइन्छ । नयाँ हाँगामा रहेको कोपिलावाट एक ठाउँमा २-३ वटासम्म फूलहरु फुल्ने गर्दछ । हाम्रो देशमा विशेष गरेर वैशाख-जेष्ठमा फूल फुली भाद्र-आश्विनमा पाक्ने गर्दछन् । बढी गर्मी हुने ठाउँमा भाद्र-आश्विनमा पुनः फूल फुली फालगुण-चैत्रमा पाक्ने गर्दछ । उन्नत जातको तुलनामा स्थानीय जातका अम्बाहरु ढिलो गरी पाक्दछन् । वर्षा याममा फल उत्पादन हुनेलाई वर्षे र हिँउदमा फल उत्पादन हुनेलाई हिउँदै वाली भनिन्छ । वर्षे वालीको तुलनामा हिउँदै वालीमा कम फल उत्पादन हुने गर्दछ । तर, हिउँदमा फलेका फलहरु आकर्षक, रोगकीरा रहित, बढी गुलिया र स्वादिला हुन्छन् ।

अम्बाको बोटमा बेमौसममा या फल चाहिएको समयमा फूल र फलको विकास गराउन निम्न प्रविधिहरु अपनाउन सकिन्छ ।

- वर्षे वालीका लागि वैशाख-जेष्ठमा स-साना फलहरु नष्ट गरीदिंदा खाद्यतत्व संचित हुन गई हिउँदका लागि भाद्र-आश्विनमा फूलहरु निस्कन्छन् । वैशाख-जेष्ठमा पुनः फूल फुल्न भन्दा १-२ महिना

अघि सिंचाई वन्द गरी माटो सुख्खा पार्ने अनि वोटको वरिपरि खनेर केही जराहरु देखिने गरी राख्ने । करिब ३-४ हप्तापछि पातहरु ओइलाईर भर्न थाल्दछन् र नयाँ पालुवा पलाउन सुरु गर्दछन् । त्यहीवेला मलखाद र सिंचाई राम्रोसंग दिई जरालाई माटोले छोपेमा फूल एकनासले फुलदछ ।

- आजकल वर्षे वाली नलिने ध्येयले वैशाख-जेष्ठमा लागेको फूललाई विभिन्न रसायन प्रयोग गरी फुल झार्ने गरिन्छ । NAA १००-४०० पिपिएम १००-४०० मिलीग्राम प्रतिलिटर पानीमा) फूल फुल्ने वेलामा छनाले फूलहरु भर्दछन् र अर्को सिजनमा प्रशस्त फुलहरु फुलदछन् ।
- फूल फुल्न भन्दा एक महिना अघि इथेफोन ६००-१२०० पिपिएम (६००-१२०० मिलीग्राम इथेफोन प्रतिलिटर पानीमा) छर्कनाले पातहरु भर्दछन् र फूलहरु एकनासले निस्कन सुरु गर्दछन् । त्यस्तै यूरिया मलको १०-१५% (१०-१५ ग्राम यूरिया प्रतिलिटर पानीमा) को भोल छनाले पनि पात एवं फूलहरु भर्दछन् ।

साधारणतया फुलेका फूलहरु मध्ये ८०% फूलमा फलको विकास हुन्छ । तर मात्र ३०-४० % फलहरु पाकेर टिप्पे अवस्थामा पुरदछन् । तसर्थ, फल भर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकेमा बढी उत्पादन लिन सकिन्छ । यसको लागि जिव्रेलिन नाम गरेको हर्मोन १५-३० पिपिएम अर्थात १५-३० मिग्रा/लिटर पानीमा) फल लागी सकेपछि छनाले फल भर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर अत्याधिक फलहरु वोटमा रहनाले अर्को सिजनमा फूलहरु नफुल्ने संभावना बढी हुन्छ ।

रोग तथा कीरा व्यवस्थापन:

कीराहरु :

फलको औंसा (Fruit Fly): यो एक प्रकारको फिङ्गा हो जसले फल पाक्ने समयमा फलको वाहिरी वोक्रामा फूल पार्दछन् र त्यसवाट लार्भा निस्कना साथ गुदिमा प्रवेश गरेर खान सुरु गर्दछन् । जसको कारणले अम्बाको फल भित्र थुप्रै लार्भाहरु देखिन्छन् । यसले गर्दा फलहरु कुहिएर भर्दछन् । यसको नियन्त्रणको लागि वर्गैचा सफा सुरघर राख्ने र कुहिएका फललाई नष्ट गर्नु पर्दछ । सकभर यी फिङ्गाहरुको वृद्धि

विकास नै हुन नदिनु वुद्धिमानी हुन्छ । हिउँदै वालीमा यो कीराको प्रकोप कम पाइएकोले उक्त वाली लिनु पर्दछ । यो कीरालाई विषादी जस्तै: मालाथियन (0.05%) ले पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

मिली वग (Mealy bug): यसले कलिला हाँगा पात र फूलवाट रस चुस्दछ । जसले गर्दा त्यस्ता भागहरू सुक्दै जान्छन् र उत्पादन कम हुन्छ । यसको नियन्त्रणको लागि मालाथियन छर्न सकिन्छ । त्यसैगरी मेटासिडको 0.1 % झोल बनाई छर्दा लाभप्रद हुन्छ ।

कत्तले कीरा (Scale Insect) : यो कीरा हरिया र साना हुन्छन् अनि फल, पात तथा डाँठमा टाँसिएर रस चुस्दछन् । डाइमेथोएटको 0.1 % झोल तथा मालाथियनको 0.4 % झोल छर्केर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

बोक्रा तथा पात खाने भुसिल कीरा (Bark and Leaf eating caterpillar): यी कीराहरू बोटको काण्डमै प्वाल पारी भित्र गएर बस्दछन् र रातमा बढी सक्रिय हुन्छन् । कपासलाई पेट्रोल, इथर वा क्लोरोफर्म आदिमा चोपेर/भिजाएर उक्त कीराले पारेको प्वालमा राखी दिनाले कीराहरू प्वाल भित्रै मर्दछन् ।

रोगहरू:

ओइलाउने रोग (Wilting): विगत केही वर्ष अधिदेखि नेपालको सबै ठाउँमा अम्बाको वोट नै सखाप पारी उत्पादन र उत्पादकत्व घटाउन प्रमुख हिस्सा ओगटेको यो रोग *Fusarium solani* र *Macrophomina phaseoli* नामक ढूसीहरूको संयुक्त वा अलग अलग आक्रमणवाट हुने गर्दछ । यसले जराको भित्री भागमा असर गरी पानी तथा खाद्य पदार्थको ओसार पसारमा अबरोध खडा गर्दछ जसले गर्दा विश्वा विस्तारै पहेलिई गएर अन्तमा ठाँडै सुक्न जान्छ । पानी जम्ने र अम्लिय एंव क्षरीय दुवै माटोमा यो रोग लाग्ने गरेको पाइएको छ ।

यसको रोकथामको लागि रोग निरोधक जातको छनौट गर्नु नै वुद्धिमानी ठहर्छ । चाइनिज अम्बा, बनारसी, नासिक, सुप्रीम, धोल्खासिन्ध भन्ने जातहरू रोग निरोधक भएकोले यसलाई रुटस्टकको रूपमा प्रयोग गरी विश्वा उत्पादन गरेर यस रोग लाग्नवाट बचाउन सकिन्छ । त्यस

वाहेक वगैचाको सफा सुरधर, पानीको निकासको प्रबन्ध र स्वास्थ वोटलाई ०.१% को दरले ८-किनोलिनेल सल्फेट (8-Quinolinol Sulphate) को इन्जेक्सन दिएमा रोग लाग्नवाट वचाउन सकिन्छ । त्यस्तै आजकल यो रोगको नियन्यणको लागि जैविक विधि पनि उपयोगमा ल्याउन थालिएको छ । यसको लागि ट्राइकोडरमा भन्ने सूक्ष्मजीवको प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ (द्विवेदी, १९९२) । रोग लागी सकेपछि यसको उपचार गर्न असम्भव हुन्छ ।

त्यसैगरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर क्याम्पसमा अबस्थित र पहाडी कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमद्वारा संचालित अम्बाको ओइलाउने रोग सम्बन्धी परियोजनाले धादिङ्गमा गरेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कृषि चून (२.५ किलोग्राम प्रतिवोटको दरले वोटको फेदमा हल्कासंग खनेर माटोसंग मिसाउने र वेभिष्टिन ०.०७५% (४ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा) मिसाएर वोटमा एकनासले छर्कने (संयुक्त रूपमा गरिएको) प्रयोग अन्य प्रयोगहरूको तुलनामा रोग नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी देखिएको छ ।

एन्थ्राक्नोजः: पात, डाँठ र फलमा काला धब्बाहरू देखिई हाँगाहरू सुकी विरुद्ध रुक्खमा मर्नु यस रोगका प्रमुख लक्षणहरू हुन् । यो रोग *Gloeosporium psidii* / *Colletotrichum psidii* नामक ढूसीवाट हुने गर्दछ । यसको नियन्त्रणको लागि कपर अक्सिक्लोराइड, डाइथेन जेड-७८, डाइफोलाईन इत्यादि ढूसीनासक औषधि छर्न सकिन्छ ।

खटिरे रोग (Canker): यो रोग *Physalospora psidii* नामक ढूसीवाट हुने गर्दछ । यो रोग लागेका फल र पातमा खटिरा जस्ता काला दाँगहरू देखिन्छन् । रोगले आक्रमण गरेका भागलाई हटाई जलाउनु र काँटछाँट गरेको ठाउँमा वोर्डो पेष्ट बनाएर छर्कनु पर्दछ । विरुद्धलाई २:२:५० को वोर्डेक्स मिक्स बनाएर पनि छर्न सकिन्छ ।

पातको थोप्ले रोग (Cercospora leaf spot): यो रोग लागेपछि तल्लो भागमा पानीको थोपा सुके जस्ता दागहरू देखा पर्दछन् । पछि गएर पातहरू पहेलिने र भर्ने गर्दछन् । फल उत्पादनमा कमी आउँछ । यो रोग *Cercospora sawadae* नामक ढूसीको आक्रमणवाट हुने गर्दछ ।

कपर अक्सिसक्लोरोइड वा चून र गन्धक १:३ को मात्रामा मिसाएर छुर्नाले रोग फैलनवाट बचाउन सकिन्छ ।

उत्पादन: वनस्पतिक प्रसारण द्वाँ र तयाँ र गरिएको विरुवाले वीजु विरुवा भन्दा चाँडो फल दिन्छ । अम्बाको बोटले ४-५ वर्षदेखि नै फल दिन सुरु गर्ने भएतापनि ८-१० वर्षको उमेरमा मात्र पुरा उत्पादन दिन सुरु गर्दछ । फलको उत्पादन हावापानी, विरुवाको जात, व्यवस्थापन पक्ष र प्रसारण विधिमा निर्भर गर्दछ । वर्षे वालीको तुलनामा हिउँदै वालीको गुणस्तर रास्तो भएता पनि उत्पादन कम हुन्छ । फल पाकन थालेपछि त्यसमा गुलियोपना, अमिलोपना, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, क्यालिसयम, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ र वासनादार पदार्थको विकास द्रुत गतिमा हुन्छ । साधारणतया अम्बाको फललाई पूर्ण रूपमा वृद्धि हुन फल लागेपछि २२ हप्ताको समय आबश्यक पर्दछ । तसर्थ फल अर्ध पहेलो अवस्थामा छँदा एक एक गरी भेट्नो सहित टिप्पु वुद्धिमानी ठहर्छ । सालाखाला एउटा बोटले २-३ किवण्टलसम्म फल दिन सक्छ ।

भण्डारण/संचिती: पूर्ण अवस्थामा पाकेको अम्बालाई धेरै समयसम्म भण्डारण गर्न सकिदैन । तसर्थ यदि टाढाको वजारमा लगी अम्बा विक्री गर्नुपर्ने भएमा अर्ध पहेलो अबस्थामा टिप्पु पर्दछ । त्यसैगरी वायुमण्डलिय तापमानले गर्दा वर्षे फललाई भन्दा हिउँदै फललाई बढी समय भण्डारण गरी १ महिनासम्म राख्न सकिन्छ । त्यसैगरी Waxing गरेर वा Gibberellic Acid को प्रयोग गरेर पनि भण्डारण क्षमता केही दिन बढाउन सकिन्छ । भण्डारण गर्दा तापक्रम व्यवस्थापनमा होस पुऱ्याउनु आबश्यक छ ।

सन्दर्भ ग्रन्थहरू :

- Dwivedi, S.K. 1992. Effects of culture filtrates of soil microbes on pathogens inciting wilt disease of guava (*Psidium guajava* L.) under in vitro condition. National Academy Science Letters. 15 (2): 33-35.
- Hedge, H.G. and Tiwari, J.P. 1981. Nat, Symp. Tropical and Subtropical fruit crops, Bangalore, PP 83.
- Mitra, S.K. and T.K. Bose 1990. Guava in Fruits: Tropical and Subtropical Fruits. T.K. Bose and S.K. Mitra, Naya Prakash, Calcutta, PP 280-303.
- Ranjit, M. and L. Pun, 1990. Trainers Manual Tropical Fruits, Department of Agriculture and Man Power Division Program, Kathmandu. Singh, Gorakh, A.K.
- Singh and Ajayo Verma 2000. Economic evaluation of Crop regulation treatments in guava (*Psidium guajava*). Indian Journal of Agricultural Sciences, 70(4): 226-30
- अधिकारी, ऋषिराज, गोपी उपेती, डिल्लीराम बराल र दुर्गामणी गौतम, २०४८, वागवानी विज्ञान विभाग, कृ.प.वि.अ.स, रामपुर।
- गौतम, दुर्गामणी र दुर्गादत्त ढकाल, २०५१. फलफुल तथा औद्योगिक वाली, वागवानी विज्ञान विभाग, कृ. प. बि. अ. सं., रामपुर, पृष्ठ १५५-१६९